

Biện pháp phá thai 2 tuần tuổi không đau

Mang thai là thiên chức, là niềm hạnh phúc của phái nữ. Thế nhưng, có những trường hợp việc mang thai là ngoài mong đợi & chính bà bầu cũng không có đủ sự tự tin để giữ & sinh đứa trẻ ra. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung ứng một số thông tin hữu ích về cách kết thúc thai kỳ 2 tuần tuổi giúp đảm bảo an toàn nhất cho bà bầu.

Bào thai 2 tuần tuổi có phá được không?

Bào thai 2 tuần tuổi vẫn chưa vào buồng tử cung của thai phụ, mà vẫn còn trong lúc đi đứng từ vòi tử cung đến tử cung. Lúc này, thai có kích thước vô cùng nhỏ, chỉ cỡ một hạt đỗ, & chưa có hình trạng định vị. Điều ấy cũng có nghĩa những cơ quan trên thân thể vẫn chưa trông thấy.

Tuy vậy, đây cũng chủ yếu là bất tiện khi các bạn muốn đình chỉ thai kỳ 14 ngày tuổi. Bởi lẽ, các cách bỏ thai an toàn ngày nay chỉ áp dụng khi thai đã làm tổ trong buồng tử cung. Bởi vậy, để biết chắc chắn thai 2 tuần tuổi có phá khỏi được không, một số chị em nên tìm đến các địa điểm khám bệnh đáng tin cậy, thực hiện siêu âm để biết chính xác tuổi thai và khu vực mà thai đang làm tổ. Các phụ nữ có bầu nên tránh trì hoãn việc kiểm tra sớm, vì trong trường hợp để thai quá 12 tuần tuổi thì việc đình chỉ thai nghén sẽ trở lên tác hại & lưu lại nhiều tai biến với bà bầu.



Phương pháp kết thúc thai kỳ 14 ngày tuổi an toàn, đúng như chỉ dẫn

Đình chỉ thai nghén 2 tuần tuổi nội khoa

Thai nghén kích cỡ nhỏ như thai 2 tuần tuổi, phương pháp kết thúc thai kỳ an toàn nhất là uống thuốc phá thai. Đây là loại thuốc dùng cộng tác hai hợp chất là Mifepristone & Misoprostol để đình

chỉ thai kỳ. Mifepristone làm cho thai ngừng phát triển, còn Misoprostol làm tăng co bóp tử cung để tống thai ra bên ngoài. Đây là biện pháp có hiệu quả cao, tỉ lệ thu được thành quả tốt từ 96% - 98%. Tuy nhiên, để tiến hành được phương pháp này hiệu quả nhất, thai nghén và bà bầu phải cung ứng được đầy đủ các yếu tố dưới đây:

- Bào thai không quá 6 tuần và bào thai đã làm tổ trong buồng tử cung, kích thước của bào thai không cao quá 2.5 cm. Thai 2 tuần tuổi khả năng vẫn đang trong quá trình di chuyển ở ống dẫn trứng, do đó chỉ sử dụng thuốc để đình chỉ thai kỳ trong trường hợp chắc nịch thai đã làm tổ trong buồng tử cung qua siêu âm.
- Mẹ bầu có sức khỏe bình thường, không mắc một số bệnh nền như suy gan, thận hư, hen suyễn, tăng đông hoặc giảm đông máu.
- Phụ nữ mang thai không có tiểu sử kích ứng với các đối tượng, hoặc những đối tượng không khác gì trong thuốc tránh thai.

Quy trình đình chỉ thai kỳ 14 ngày tuổi nội khoa:

1. Phụ nữ mang thai được thăm khám sức khỏe tổng quát bởi các bác sĩ đầu ngành giúp đảm bảo không bị mắc các bệnh về máu, suy gan, suy thận hay bị phản ứng với đối tượng trong thuốc ngừa thai dự kiến sử dụng.
2. Những thầy thuốc thực hiện siêu âm để kiểm tra xem thai nhi đã phía trong dạ con và đạt được các tiêu chí nêu trên hay chưa?
3. Bác sĩ sẽ cho phụ nữ có bầu uống viên thuốc thứ 1. Viên thuốc này sẽ khiến cho bào thai ngừng tiến triển, & bong róc khỏi thành dạ con. Sau thời điểm uống, bà bầu sẽ được quan sát xem có lạ thường gì xảy ra không, trong trường hợp không sẽ được xem về nhà nghỉ ngơi.
4. Hết bốn mươi tám giờ nghỉ ngơi tại gia, phụ nữ mang thai sẽ quay lại trung tâm y tế khoảng thời gian trước để thăm khám & sử dụng viên thuốc thứ hai. Viên thuốc này có lợi ích làm thúc đẩy sự co bóp tử cung giúp bào thai đơn giản được đẩy ra phía ngoài hơn. Do đó, phụ nữ mang thai sẽ thấy phần bụng dưới đau quặn.
5. Sau thời điểm dùng viên thuốc thứ hai, phụ nữ mang thai sẽ được bảo toàn cơ sở y tế để quan sát khoảng 4 giờ và cứ 30 phút các thầy thuốc sẽ đo nhịp tim, huyết áp một lần. Trong trường hợp trong thời gian này chưa có gì khác thường, phụ nữ mang thai khả năng về nhà.

Vào thời kỳ 10 ngày sau thời điểm sử dụng thuốc, đa phần bệnh nhân sẽ thấy đau bụng & ra nhiều máu, máu sẽ vón thành cục, mảng & được đẩy ra bên ngoài. Có những trường hợp, lượng máu khả năng ra ít hơn, tuy vậy kéo dài khoảng 4 tuần.

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/cach-pha-thai-2-tuan-tuoi-an-toan-khong-dau>

Phá thai 14 ngày tuổi bằng cách hút thai

Nếu thai nghén đã làm tổ trong buồng tử cung và giải pháp phá thai nội khoa thất bại, thầy thuốc chuyên khoa khả năng chọn lọc giải pháp đình chỉ thai nghén khác cũng an toàn là hút thai. Phương pháp này thường ứng dụng khi bào thai từ 6 đến 3 tháng tuổi. Nhưng mà với bào thai 2 tuần tuổi đã làm tổ trong dạ con thì những thầy thuốc cũng có thể chọn lọc để nạo phá thai.

Giải pháp này cho tỉ lệ thu được thành quả tốt cao, khoảng 98% các nếu như, & thời kỳ thực hiện chỉ từ 10 đến 15 phút. Quy trình chọn nạo hút thai gồm phác đồ sau:

- Thai phụ đến trung tâm y tế và được những thầy thuốc tiến hành khám sức khỏe tổng quan, tuổi thai, vị trí & độ bám của thai nhi vào buồng dạ con.
- Sau thời điểm đủ hoàn cảnh về sức khỏe, thầy thuốc sẽ thực hiện gây mê tại chỗ hoặc gây mê cho mẹ bầu. Một ống nano siêu dẫn với độ đàn hồi cao sẽ được các thầy thuốc chọn

qua âm đạo vào buồng tử cung. Quá trình này sẽ được quan sát trên màn hình & thai nhi sẽ được hút sạch tất cả.

Địa chỉ phá thai an toàn hà nội <https://phathaithaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Chi phí phá thai <https://phathaithaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

Phá thai 14 ngày tuổi có nguy hiểm không?

Cho dù nạo phá thai 14 ngày tuổi bằng thuốc hay bằng biện pháp hút chân không đều khá an toàn, tuy vậy vẫn đang một tỉ lệ nhỏ những bà bầu bị ảnh hưởng không tốt về sức khỏe cơ thể.

Một số trạng thái có thể mắc phải khi đình chỉ thai nghén 2 tuần bằng thuốc:

- Kích ứng với thuốc đình chỉ thai nghén: một vài phụ nữ có bầu có cơ địa mẫn cảm với những đối tượng trong thuốc ngừa thai, gây ra những hiện trạng dị ứng, phản vệ với những biểu hiện như mẫn ngứa rát, nổi mề đay, khó thở, chóng mặt, huyết áp thấp.
- Buồn nôn, nôn hoặc đi ngoài phân lỏng: Vì thuốc đình chỉ thai nghén làm tăng các cơn co bóp dạ con, nên cũng làm tăng co thắt dạ dày - ruột. Phụ nữ có bầu sẽ cảm giác đau quặn khu vực bụng, ói mửa, nôn & “tào tháo đuổi”. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ khả năng kê thêm một số thuốc giảm đau như paracetamol, ibuprofen để làm dịu những đau đớn. Chưa kể đến, thai phụ có thể sử dụng một chai nước nóng hoặc khăn ấm để chườm lên vùng bụng.
- Cơn đau ở đầu, xây xẩm mặt mày & sốt trong vài giờ đầu: nếu như này, phụ nữ có bầu nên uống đủ nước hoặc nước quả tươi, tuyệt đối đừng nên cafe hoặc đồ uống có cồn, có thể sử dụng thêm thuốc giảm đau, hạ sốt như paracetamol khi nhất thiết. Một số triệu chứng này thường sẽ thuyên giảm và mất đi mà không gây nguy hại cho phụ nữ có bầu.
- Các bệnh bội nhiễm sản phụ khoa: dù là phá thai bằng thuốc không gây nên ảnh hưởng trực tiếp vùng sinh dục, nhưng tính chất của thuốc phá thai khả năng làm thay đổi PH & cấu tạo của một số phần mềm. Nếu như phụ nữ không vệ sinh chỗ kín sạch sẽ thì sẽ có nguy cơ mắc những bệnh viêm nhiễm phụ khoa.
- Bào thai hiện đang sau khi sử dụng thuốc: nhân tố của hiện trạng này là sử dụng thuốc không đúng các bước và không được thăm khám lại sau khi hết lộ trình. Để hạn chế điều này, phụ nữ mang thai cần lựa chọn những trung tâm chăm sóc sức khỏe và các bác sĩ có uy tín, chất lượng, tiến hành siêu âm dạ con để chắc chắn thai đã được loại bỏ hoàn toàn.

Một số biến chứng khả năng mắc phải khi nạo phá thai 14 ngày bằng hút chân không:

- Do sử dụng thiết bị tác động trực tiếp vào dạ con nên nguy cơ viêm nhiễm là rất cao. Vào thời gian này một số thầy thuốc chuyên khoa cần kê cho bà bầu một liệu trình thuốc antibiotic thích hợp.
- Ra máu nhiều gây ra sụt giảm cơ thể, hoa mắt, xây xẩm mặt mày. Trường hợp này phụ nữ mang thai cần được tĩnh dưỡng, bổ sung sắt và những vitamin đầy đủ.
- Sốt thai, hiện đang sốt lại rau & thai trong dạ con.
- Thủng hoặc vết thương tử cung
- Dính dạ con

Benh vien Thai Ha <https://phongkhamthaiha.org>

Bệnh viện Thái Hà <https://phathaithaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

Một vài lưu tâm khi nạo phá thai 2 tuần tuổi

Hiện nay có một số cách nạo phá thai an toàn & đạt hữu hiệu tương đối cao, việc bỏ thai 14 ngày tuổi vẫn tiềm ẩn những rủi ro với sức khỏe của phụ nữ có bầu. Để hạn chế những biến chứng có thể mắc phải, phụ nữ mang thai cần có một số lưu tâm như sau:

- Không tùy tiện đình chỉ thai kỳ tại nhà hay tại một số trung tâm chăm sóc sức khỏe không uy tín. Người mẹ cần lựa chọn những thầy thuốc chuyên khoa phụ khoa giàu thâm niên và hoàn toàn tuân thủ theo lời nhắc nhở hay quy trình điều trị của họ.
- Sau thời điểm bỏ thai, người bị bệnh cần tĩnh dưỡng, bổ sung một số dinh dưỡng và vitamin không thể thiếu để thân thể mau phục hồi.
- Vệ sinh cơ quan sinh dục sạch sẽ. Nếu như thấy vùng kín có biểu hiện của viêm nhiễm, cường kinh thì cần phải đến bệnh viện để được điều trị ngay từ giai đoạn đầu.
- Sau khi nạo phá thai, người phụ nữ nên tránh giao hợp ít đặc biệt 14 ngày.